


به نام خدا

سکته های هموراژیک ICH

خونریزی بداخل بافت مغزی، بطن مغزی یا فضای زیر عنكبوتیه در اثر علل مختلف رخ می دهد که 20 درصد کل بیماری های مغزی - QA حدود عروقی را به خود اختصاص داده است. بیماران دچار این نوع سکته در مقایسه با بیماران دچار سکته های ایسکمیک پس از سپری کردن فاز حاد بیماری، به نقایص شدیدتری مبتلا می شوند و دوره بهبودی نیز در آنها طولانی تر است .

Hemorrhagic Stroke



علل خونریزی های مغزی

- **فشار خون بالا :** حدود 80 درصد سکته های هموراژیک در اثر فشارخون کنترل نشده که باعث پارگی عروق مغزی شده ایجاد می شود. در واقع شایعترین علت ICH می باشد.
- **آنوریسم داخل جمجمه ای :** یا همان اتساع دیواره شریان مغزی در اثر ضعف و نقص دیواره شریان مغزی که آن نیز خود به دنبال کهولت سن، تروما به سر، فشار خون بالا و ... می باشد.
- **ناهنجاری های وریدی- شریانی :** نوعی ناهنجاری دوران جنینی که شریان ها و وریدهای مغزی بدون داشتن بستر مویرگی در هم گره میخورند. فقدان بستر مویرگی منجر به اتساع وریدها و شریان ها و در نهایت پارگی آنها میشود. معمولاً علت شایع ICH در افراد جوان محسوب می شوند.
- **داروها :** برخی داروهای خاص مثل آمفتامین و ضد انعقادها

علائم

1- اختلال هوشیاری 2- سردرد شدید 3- نقایص حرکتی، حسی و شناختی 4- اختلالات کارکردی اعصاب جمجمه ای 5- از بین رفتن دید پیرامونی و دوبینی 6- همی پازی و همی پلژی 7- آتاکسی 8- دیس فاژی و دیس آرتری 9- تهوع و استفراغ 10- احتمال حملات تشنجی 11- سرگیجه و وزوزگوش 12- درد و سفتی قسمت پشت گردن و ستون فقرات که در صورتیکه علت ICH، آنوریسم باشد، رخ می دهد و باعث تحریک فرد میشود.

راههای تشخیصی

- 1- سی تی اسکن
- 2- MRI
- 3- آنژیوگرافی مغزی جهت آنوریسم داخل جمجمه ای
- 4- LP : زمانیکه نتایج سی تی اسکن منفی باشد و افزایش ICP وجود نداشته باشد، از این روش جهت تشخیص استفاده میشود.



بیمارستان خصوصی گروه پزشکی شمس

سکته های هموراژیک



تهیه و تنظیم :

طناز روشنی پور کارشناس پرستاری
رباب پذیرش کارشناس بهبود کیفیت

تأیید کننده : دکتر فریدون داودنژاد متخصص
آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه قلب و ریه

تاریخ تدوین : مرداد 1396

تاریخ آخرین بازنگری : بهمن 1400

درمان

- 1- **حمایتی** : استراحت و داشتن آرامش و دوری از استرس و بیقراری، استفاده از جوراب الاستیک ضد آمبولی (تا از بروز ترومبوز ورید عمقی جلوگیری گردد)
- 2- **دارویی** : جهت رفع علائم مثل کنترل فشار خون، کنترل تشنج، رفع داروهای عامل
- 3- **جراحی** : بیشتر در بیماران دارای خونریزی مخچه ای جراحی صورت میگیرد تا از آنوریسم پاره نشده جلوگیری بعمل آید.

منبع :

برونر سوارث

عوارض

- 1- اسپاسم عروق مغزی و متعاقباً ایسکمی مغزی و هیپوکسی مغزی
 - 2- خونریزی مجدد و گسترش هماتوم
 - 3- هیدروسفالی حاد
 - 4- تشنج
 - 5- افزایش ICP و متعاقباً ادم مغزی و فتق
- ❖ جهت درمان این عارضه سرم مانیتول تجویز می شود.

